

Diagnóstico Precoce da Doença Renal Crônica (DRC) em Gatos: O Que Realmente Funciona?

O Alerta Silencioso:

Gatos "Saudáveis" em Risco



40,9% dos gatos aparentemente saudáveis apresentam redução na GFR.

Quase metade sem sinais clínicos já possui $GFR < 2,5 \text{ mL/min/kg}$. 50% no Estágio IRIS I já têm GFR reduzida.

Mesmo sem azotemia, metade com alterações morfológicas já sofre perda funcional importante.



BIOMARCADORES: Creatinina vs. SDMA Point-of-Care (POC)



Creatinina Sérica:
Um Aliado Confiável



Correlação inversa moderada com GFR ($r = -0,55$).

Odds Ratio 18,3x
para prever GFR baixa.

Mais sensível para detectar mudanças iniciais na função renal.



SDMA Point-of-Care:
Baixo Desempenho Preditivo



Não apresentou correlação significativa com GFR nem com creatinina.

Falhou como preditor isolado. Superado pela Creatinina no diagnóstico precoce.



ACHADOS DE IMAGEM: O Poder da Ultrassonografia



Contorno Renal Irregular:

Aumento do Risco.

O maior sinal de alerta. Gatos com este achado têm 65,8 vezes mais chances de GFR baixa ($p=0,003$).



Definição Corticomedular Reduzida:

Aumento do Risco.

Preditor crítico. Perda da distinção corticomedular aumenta risco em 19,9 vezes ($p=0,022$).



A ultrassonografia deve ser obrigatória no check-up. Identifica riscos que biomarcadores sezinhos podem ignorar no início.

Comparação do Risco (Odds Ratio) para GFR Baixa ($< 2,5 \text{ mL/min/kg}$)

